



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期/思春期							
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	不活化		①	②	③						④ (注1)												
肺炎球菌 (PCV13)	不活化		①	②	③						④	(注2)											
B型肝炎	ユニバーサル		①	②					③		(注3)												
	母子感染予防	①	②						③														
ロタウイルス	1価		①	②					(注4)														
	5価		①	②	③				(注5)														
4種混合 (DPT-IPV)	不活化			①	②				③		④ (注6)		(7.5歳まで)										
3種混合 (DPT)	不活化			①	②				③		④ (注6)		(7.5歳まで)					⑤ (注7)	⑥11-12歳 (注8)				
2種混合 (DT)	不活化																				11歳 ①	12歳	
ポリオ (IPV)	不活化			①	②				③		④ (注6)		(7.5歳まで)					⑤ (注9)					
BCG	生								①														
麻疹・風疹混合 (MR)	生										①						② (注10)						
水痘	生										①			②	(注11)								
おたふくかぜ	生										①						② (注12)						
日本脳炎	不活化													①	②	③	(7.5歳まで)	④9-12歳					
インフルエンザ	不活化										毎年 (10、11月などに) ①②										13歳より①		
ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化																		(注13)	小6	中1 ①②③ (注14)		中2～高1

定期接種の推奨期間
 定期接種の接種可能な期間
 任意接種の推奨期間
 任意接種の接種可能な期間
 添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
 健康保険での接種時期